

MEDICAMENTOS QUE DEBE SUSPENDER TEMPORALMENTE ANTES DE LA CIRUGÍA

Deje de tomar cualquiera de los medicamentos enumerados a continuación según lo indicado por el Dr. Sliva. Esto incluye medicamentos que contengan aspirina, medicamentos anticoagulantes, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), medicamentos para la osteoporosis y medicamentos para la artritis reumatoide. Consulte sus instrucciones posoperatorias, dadas en su cita preoperatoria antes de la cirugía, cuando pueda reanudar el uso de sus medicamentos. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a sus medicamentos, comuníquese con el personal de enfermería o los asistentes médicos.

Antiinflamatorios no esteroideos (AINE):

Advil (ibuprofeno); Aleve, Anaprox (naproxeno); Ansaid (flurbiprofeno); Arthrotec (diclofenaco); Caldolor (ibuprofeno); Cambia, Cataflam (diclofenaco); Celebrex (celecoxib); Clinoril (sulindaco); Daypro (oxaprozina); Doan's (salicilato de magnesio); Dolobid (diflunisal); Feldene (piroxicam); Flector (diclofenaco); Indocin (indometacina); Lodine (etodolaco); Meclomen (meclofenamato); Mobic (meloxicam); Motrin (ibuprofeno); Naprosyn (naproxeno); NeoProfen (ibuprofeno); Ordis (ketoprofeno); Pennsaid (diclofenaco); Relafen (nabumetona); Treximet (sumatriptán-naproxeno); Vicoprofen (hidrocodona-ibuprofeno); Voltaren (diclofenaco); Zipsor, Zorvolex (diclofenaco): **suspenderlo 2 semanas antes de la cirugía y reanudarlo según las indicaciones del Dr. Sliva**

Aspirina o medicamentos que contengan aspirina:

Aggrenox (aspirina/dipiridamol); Alka Seltzer (antiácido-aspirina); Anacin (aspirina-cafeína); Bayer (aspirina); Ascriptin (antiácido-aspirina); Azulfidine (sulfasalazina); Bufferin (antiácido-aspirina); Canasa (mesalamina); Colazal (balsalazida); Dipentum (sodio de olsalazina); Ecotrin (aspirina); Excedrin (aspirina-cafeína); Fiorinal (aspirina-cafeína); Halfprin (aspirina); Kaopectate (subsalicilato de bismuto); Norgesic (aspirina-cafeína); Pepto-Bismol (subsalicilato de bismuto); Percoden (oxicodona-aspirina); Compuesto de Soma (aspirina-carisoprodol); Tricosal (magnesio-colina): **suspenderlo 7 días antes de la cirugía y reanudarlo según las indicaciones del Dr. Sliva**

Anticoagulantes:

Aggrastat (tirofibán); Angiomax (bivalirudina); Argatroban (argatroban); Arixtra (fondaparinux); Brilinta (ticagrelor); Coumadin (warfarina); Effient (prasugrel); Eliquis (apixabán); Fragmin (dalteparina sódica); Heparin; Integrilin (eptifibatida); Iprivask (desirudina); Lovenox (enoxaparina); Persantine (dipiridamol); Plavix (clopidogrel); Pletal (cilostazol); Pradaxa (dabigatrán); ReoPro (abciximab); Savaysa (edoxabán); Ticlid (ticlopidina); Xarelto (rivaroxabán); Zontivity (vorapaxar): **suspenderlo y reanudarlo según las indicaciones del Dr. Sliva**

Medicamentos para la osteoporosis:

Actonel (risedronato); Atelvia (risedronato); Binosto (alendronato); Boniva (ibandronato); Evista (raloxifeno); Fosamax (alendronato); Foreto (teriparatida); Prolia (denosumab); Reclast (ácido zoledrónico); Xgeva (denosumab): **suspenderlo 1 mes antes de la cirugía de fusión y reanudarlo 3 meses después**

MEDICAMENTOS QUE DEBE SUSPENDER TEMPORALMENTE ANTES DE LA CIRUGÍA

Medicamentos para la artritis reumatoide:

Arava (leflunomida); Azasan (azatioprina); Azulfidine (sulfasalazina); Imuran (azatioprina);
Plaquenil (hidroxicloroquina): ***suspenderlo el día antes de la cirugía y reanudarlo 2
semanas después de la cirugía***

Cimzia (certolizumab): ***no inyectarlo por 4 semanas después de la cirugía***; Enbrel
(etanercept): ***no inyectarlo por 1 semana después de la cirugía***; Humira (adalimumab): ***no
inyectarlo por 2 semanas después de la cirugía***; Remicade (infliximab): ***no inyectarlo por
6 semanas después a la cirugía***; Xeljanz (tofacitinib): ***suspenderlo 2 semanas antes de la
cirugía. PUEDE REANUDAR ESTOS MEDICAMENTOS 1 MES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA***

Otro: Suplementos herbales (incluidos aceites de pescado); Niacina (vitamina B3):
suspenderla 2 semanas antes de la cirugía y reanudarla 2 semanas después de la cirugía