

Hoja de instrucciones para el drenaje posoperatorio

- Después de la cirugía, se colocará un drenaje cerca de su incisión para recolectar cualquier acumulación de sangre producto de la cirugía.
- Es probable que se vaya a casa después de la cirugía con un drenaje.
- Antes de que le den el alta del hospital, el miembro del personal de enfermería le indicará cómo vaciar y quitar el drenaje en su casa.
- El hospital debe proporcionarle los suministros necesarios: taza, gasa y cinta adhesiva.
- Debe vaciar el drenaje cada 8 horas: mañana, tarde y noche.
- Retire el drenaje de la siguiente manera:

Si la cirugía es el día:	Retire el drenaje en la mañana del:
Lunes	Jueves
Martes	Viernes
Miércoles	Sábado
Jueves	Domingo
Viernes	Lunes



Instrucciones para retirar el drenaje:

- Vacíe el drenaje y deje la tapa abierta. En posición sentada, retire la cinta blanca y el vendaje por encima del punto de inserción del drenaje.
- Sujete con suavidad el tubo de drenaje cerca de la piel y tire de él de forma constante. Después, deseche el drenaje y el vendaje. El tubo de drenaje puede insertarse 4 a 8 pulgadas debajo de la piel.
- Con un vendaje de gasa, aplique un poco de presión en el punto del drenaje para recolectar cualquier drenaje residual, si fuera necesario. Coloque un vendaje nuevo de gasa sobre el punto del drenaje.
- Deje el vendaje durante 24 horas. Si no hay drenaje, puede quitarse el vendaje y ducharse.
- Cirugía lumbar y cervical posterior: Deje durante 7 días el vendaje impermeable que cubre su incisión. Deje la incisión expuesta al aire. Las suturas adhesivas Steri-strips permanecen en su lugar durante 2 semanas, a menos que se caigan por sí solas.
- Cirugía del cuello uterino anterior: El vendaje blanco se puede quitar el día 3 después de la cirugía. Deje la incisión expuesta al aire. Las suturas adhesivas Steri-strips permanecen en su lugar durante 2 semanas, a menos que se caigan por sí solas.