
FUSIÓN DE LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA

EXPLICACIÓN QUIRÚRGICA:

Se realiza una pequeña incisión en el costado del área de la cadera para llegar al hueso de la pelvis. Se colocan de 2 a 3 tornillos, con la asistencia de radiografías como guía, a través de la articulación sacroilíaca para estabilizar y fusionar dicha articulación de la manera menos invasiva.

HOSPITALIZACIÓN:

Por lo general, esta cirugía se realiza de forma ambulatoria y el paciente se puede ir a casa el mismo día. El personal de enfermería de la sala de recuperación le ayudará a levantarse de la cama y a comenzar a apoyar la punta de los dedos del pie con muletas sin dejar caer todo el peso. Antes de la cirugía, recibirá fisioterapia para que le enseñen cómo realizar esto.

Fusión de la articulación sacroilíaca Instrucciones posoperatorias

Cuidado de heridas

- Mantenga el área de la incisión seca y limpia. No coloque ningún ungüento ni soluciones antibióticas sobre la incisión. Para cerrar la piel, se utilizan suturas adhesivas (Steri-strips) o grapas. Deje que estas suturas se caigan solas o quítelas si esto no ocurre al cabo de 2 semanas. Si tiene grapas, recibirá una cita para retirarlas 3 semanas después de la cirugía. Si nota **algún tipo de secreción**, enrojecimiento, hinchazón o aumento del dolor en el lugar de la incisión, llame al consultorio de inmediato. Puede usar una compresa de hielo después de la cirugía para aliviar el malestar incisional, según sea necesario, colocándola durante 20 minutos y luego retirándola durante el mismo tiempo.
- Se puede duchar entre 3 y 4 días después de la cirugía, siempre y cuando el apósito impermeable blanco Silverlon esté sellado e intacto. Retire el apósito impermeable 7 días después de la cirugía. No tome baños ni entre a la piscina durante 6 semanas ni antes de que el médico le realice una evaluación.
- Para obtener un mejor resultado estético, mantenga su incisión alejada de la luz solar directa y de las cabinas de bronceado hasta que se desvanezca por completo y recupere el tono de la piel. De lo contrario, existe el riesgo de cambio de color permanente. Puede usar loción de vitamina E para masajear la incisión después de 6 semanas.

Actividades y restricciones: al menos durante 6 semanas después de la cirugía

- **Restricción de apoyo de peso en la punta de los dedos del pie durante 6 semanas después de la cirugía.**
- Se le darán muletas o un andador antes de la cirugía y se programarán sesiones de fisioterapia para enseñarle las técnicas adecuadas para las restricciones de soporte de peso.
- No utilice una silla reclinable (principalmente porque le obliga a encorvarse y le dificulta incorporarse correctamente). Puede cruzar las piernas en los pies y las rodillas para vestirse. Evite hacerlo durante períodos prolongados.
- No levante más de 20 libras.
- Por lo general, la fisioterapia formal comenzará alrededor de las 6 semanas después de la cirugía. Puede tener relaciones sexuales 6 semanas después de la cirugía, siempre que esto no le cause ningún tipo de dolor. Puede volver a conducir entre 2 y 4 semanas después de la cirugía cuando los analgésicos ya no puedan causar alteraciones en su juicio.
- Debe usar medias de compresión TED durante 2 semanas posteriores a la cirugía durante el día y luego quitarlas por la noche.

Medicamentos y nutrición

- **El aumento de ingesta de proteínas mejora considerablemente la tasa de cicatrización exitosa de heridas. No podemos dejar de recomendarle que beba hasta 2 batidos de proteínas al día, además de consumir su alimentación habitual, durante las primeras 6 semanas.**
- Para evitar el estreñimiento que provocan los medicamentos narcóticos, siga el régimen intestinal que se describe en la hoja aparte que se le proporcionó.
- Durante el próximo año, deberá tomar antibióticos antes de cualquier trabajo dental o procedimiento médico invasivo. De ser posible, evite los procedimientos dentales durante 3 meses después de la cirugía.
- No tome medicamentos antiinflamatorios (por ejemplo, ibuprofeno o naproxeno) durante 2 semanas antes y 6 semanas después de la cirugía, a menos que hable específicamente sobre esto con el cirujano.
- No tome ningún medicamento anticoagulante (por ejemplo, Coumadin, Plavix, Eliquis, Xarelto, aspirina) durante 1 semana antes. Consulte su hoja de instrucciones posoperatorias para reanudar el uso de anticoagulantes según las indicaciones del médico.
- No tome ningún medicamento para la osteoporosis (por ejemplo, Fosamax, Actonel, Evista, Prolia) durante 1 mes antes y 3 meses después de la cirugía, a menos que lo hable específicamente con el cirujano.
- Es posible que se deban suspender temporalmente los medicamentos para la artritis reumatoide antes y después de la cirugía. Notifique a su médico sobre cualquiera de estos medicamentos (por ejemplo, Enbrel, Remicade, Imuran, Arava, Humira) y consulte su hoja de instrucciones posoperatorias para conocer el plazo que le indique el médico.
- No tome suplementos a base de hierbas, incluidos aceites de pescado o niacina (vitamina B3), 2 semanas antes ni 2 semanas después de la cirugía.
- Solo un recordatorio: NO FUME. El humo de tabaco, incluso el humo de segunda mano, y la nicotina (incluso chicles, parches o cigarrillos electrónicos) después de la cirugía de fusión pondrá en peligro el proceso de cicatrización y puede provocar dolor crónico y la necesidad de una cirugía adicional.
- Tome calcio de venta libre (600 mg) diariamente y vitamina D3 (2000 UI) 2 veces al día, con las comidas, antes de la cirugía y durante 6 meses después de esta. Dependiendo del nivel de vitamina D que tenga antes de la cirugía, es posible que le solicitemos que tome en su lugar un suplemento de vitamina D3 con receta. Si tiene antecedentes de enfermedad renal o cálculos renales, hable con su proveedor de atención primaria (PCP) sobre el ajuste de la dosis de calcio antes de comenzar con los suplementos. El aumento de ingesta de proteínas también mejora la tasa de cicatrización satisfactoria.
- Los medicamentos recetados para el dolor posoperatorio se deben tomar según sea necesario, no en horarios programados. Puede alternar los analgésicos con Tylenol para el dolor crónico según sea necesario (límite diario de Tylenol: 4000 mg). No tome los analgésicos y el relajante muscular al mismo tiempo. Estos medicamentos se deben tomar con una diferencia de 2 a 3 horas.

- Norco/hidrocodona es un medicamento que puede generar dependencia. Debe dejarlo de tomar lo antes posible

Preguntas y emergencias

Llame al 815-398-9491 durante el horario de atención (de lunes a jueves, de 8 a. m. a 4 p. m., y viernes de 8 a. m. al mediodía) si tiene alguna pregunta o emergencia. **Los resurtidos de medicamentos solo se autorizarán durante el horario de atención.** Especifique si llamó por una emergencia y se le comunicará con el personal de enfermería especializado en columna vertebral. Todas las emergencias se informan de inmediato al médico.

Después del horario de atención, puede llamar al 815-398-9491 y el servicio de contestación contactará a su médico. Si este estuviera fuera de la ciudad o si fuese fin de semana, otro médico o asistente médico estará disponible.